

Tel: 0546- 621489

	Middel	Toediening	Dosering	Frequentie	Duur	Bijz.
Acute longontsteking – Benauwd Ziek – slecht eten – Temp >39.5°C						
• 1 ^{ste} keus	Depocilline [®]	In de spier	4ml/ 100 kg	1x daags	Min 5 dgn	
• 2 ^{de} keus	Albipen LA [®]	In de spier	15ml/ 100 kg	1x per 48 uur	2 maal	Max 20 ml per injectieplaats
	Ampicillan 20% [®]	In de spier	5ml/ 100 kg	2x daags	Min 5 dgn	
	Engemycine 10% [®]	In de spier	5ml/ 100 kg	1x daags	Max 5 dgn	Max 10 ml per injectieplaats
• Koortsremmer + pijnstillers	Rimadyl [®]	Onder de huid	1ml/ 35 kg	Werkt 3 dgn	1 malig	
Chronische longontsteking						
• 1 ^{ste} keus	Ampicillan 20% [®]	In de spier	5ml/ 100 kg	2x daags	10 dagen	
Navelontsteking						
• 1 ^{ste} keus	Depocilline [®]	In de spier	4ml/ 100 kg	1x daags	Minimaal 5 dagen	
• 2 ^{de} keus	Ampicillan 20% [®]	In de spier	5ml/ 100 kg	2x daags	Minimaal 5 dagen	
Dikke wang (Difterie)						
• 1 ^{ste} keus	Depocilline [®]	In de spier	1ml/ 10 kg	1x daags	10 dagen	
Algemeen						
<ul style="list-style-type: none"> • Schatting van het juiste gewicht van het kalf is zeer belangrijk: meet dit met een lint. • Doseer nooit onder bij antibiotica! • Wissel de kant waar gespoten wordt per dag af ter voorkoming van spuitplekken. • Werk met schone naalden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur een kalf gedurende en na behandeling, boven de 39.5 °C is koorts. • Bel voor advies en bij onvoldoende verbetering de dierenarts. • Preventie van longklachten bij het jongvee bevat twee belangrijke dingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Klimaat: voorkom tochtval maar zorg voor een fris klimaat.</i> ○ <i>Vaccineren: vraag naar een vaccinatieschema ter voorkoming van pinkengriep.</i> 					