

Bedrijf:

Tel: 0546- 621489

Algemeen		Algemene behandeling bij kalverdiarree				
<ul style="list-style-type: none"> Eerst mestonderzoek doen om de veroorzaker van diarree te achterhalen; binnen 1 uur kunnen we dit op de praktijk onderzoeken! Mest direct uit kalf halen. Een gerichte behandeling tegen deze veroorzaker instellen in overleg met de dierenarts. Bel bij onvoldoende verbetering voor advies! 		<ul style="list-style-type: none"> Vocht: Veel Vaak en Vlug! <ul style="list-style-type: none"> Melk blijven doorgeven: 3x daags 1-2 Liter. Kopje biest in melk doen. Daarnaast vocht: 3x daags 1-2 Liter water met Electrolyten. Electrolyten: <ul style="list-style-type: none"> Door water: Boviferm[®], Glutellac[®], Biopect[®], Lactolyte[®] Door melk: Boviferm[®], Glutellac[®] 				
		Middel	Toediening	Dosering	Frequentie	Duur
Diarree – Kalf staat/licht en drinkt zelf						
<ul style="list-style-type: none"> 1^{ste} keus 		/*	/	/	/	
		Boviferm [®] +Colistine [®]	In water	1 zakje+zie bus	2x daags	Tot diarree weg is
<ul style="list-style-type: none"> 2^{de} keus 		Duoprim ^{®*}	In de spier	1ml/ 20 kg	2x daags	3 dagen
		Boviferm [®] +Colistine [®]	In water	1 zakje+zie bus	2x daags	Tot diarree weg is
<p>*NB: Voor bijspuiten in de spier met antibiotica is bij kalverdiarree vaak geen reden omdat veroorzaker niet altijd een bacterie is. Doe daarom eerst onderzoek naar verwekker voor gerichte aanpak.</p>						
Diarree – Kalf ligt – Drinkt niet – Koud in bek						
<ul style="list-style-type: none"> Bel de dierenarts voor infuus + Vocht blijven geven! 						
Biestverstrekking						
<ul style="list-style-type: none"> Biest is eerste melking, direct na geboorte 2-3 L met speen. 10 uur later nogmaals 2-3 L met speen. Totaal 5 Liter in eerste 12 uur! Bij diarree na de 2^{de} dag kopje biest bij melk indoen. 						