

Bedrijf:

Tel: 0546- 621489

| | Middel | Toediening | Dosering | Frequentie | Duur |
|---|---|---------------|---|---------------|---------------------------|
| Subklinische mastitis: Hoogcelgetal koe (Koe > 150. Vaars > 100) | Neem een monster voor BO en overleg over welk middel te gebruiken. | | | | |
| Milde mastitis – Vlokje in de melk Koe niet ziek – Temp < 40°C: | | | | | |
| • 1 ^{ste} keus: | Avuloxil® /Ubrolaxin® | In uier | 1 injector per keer | 2xdgs / 1xdgs | 3 x / 2 x |
| | Mamyzin® | In de spier | Dag1: 10 gr. Dag 2+3: 5 gr | 1x daags | 3 dagen |
| • 2 ^{de} keus: | Avuloxil® /Ubrolaxin® | In uier | 1 injector per keer | 2xdgs / 1xdgs | 3 x / 2 x |
| | Duoprim® | In de spier | 1ml/ 32 kg | 2x daags | 3 dagen |
| Mastitis – melk en kwartier afwijkend Koe ziek – Temp > 39°C – Sloom: | | | | | |
| • 2 ^{de} keus: | Avuloxil® /Ubrolaxin® | In uier | 1 injector | 2xdgs / 1xdgs | 3 x / 2 x |
| | Duoprim® | In de spier | 1ml/ 32 kg | 2x daags | 3 dagen |
| Evt pijnstilling bijgeven: | Rimadyl® | Onder de huid | 1ml/ 35 kg | Werkt 3 dgn | 1 malig |
| Ernstige mastitis – melk en kwartier sterk afwijkend Koe ziek – Temp > 40°C – Koud – Zeer sloom/ plat | <i>Bel de dierenarts voor overleg en neem een monster!</i> | | | | |
| Algemeen | Droogzetten: Keuze droogzetters afhankelijk van BO's! Overleg met dierenarts | | | | |
| • Neem vóór behandeling altijd een melkmonster voor eventueel BO en stop dit in de vriezer. | Laag celgetal (Koe < 150. Vaars < 100). | | Orbenin Dry cow® of Nafpenzal® + Orbeseal® | | Droogzetter Teatsealer |
| • Melk kwartier voor inbrengen injector geheel uit. | Hoog celgetal (Koe > 150. Vaars > 100). | | Orbenin Extra Dry Cow® + Orbeseal® | | Droogzetter Teatsealer |
| • Trek kwartier met mastitis regelmatig uit. | | | | | |
| • Temperatuur koe. | | | | | |